


# ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ในการใช้น้ำมันกัญชาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 402 ราย

## ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง



1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.4  
เพศชาย ร้อยละ 31.6
2. มีอายุเฉลี่ย 62.1 ปี
3. การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 56
4. มีความรู้เกี่ยวน้ำมันกัญชาในระดับต่ำ ร้อยละ 62.7
5. ความตั้งใจในการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาโรค ร้อยละ 24.6

## ความรอบรู้ในการใช้น้ำมันกัญชา

- มีความรอบรู้ในการใช้น้ำมันกัญชาไม่เพียงพอ ร้อยละ 73.4



## ปัจจัยที่สัมพันธ์ในการใช้น้ำมันกัญชา

- 1) ทักษะของสมาชิกในครอบครัวต่อการใช้น้ำมันกัญชา
- 2) การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนรู้จัก
- 3) ความรอบรู้ในการใช้น้ำมันกัญชา

## ผลการศึกษา

### ปัจจัยนำ

- 1) การมีอายุที่เพิ่มขึ้น
- 2) การมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
- 3) การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- 4) การมีความรู้เกี่ยวกับน้ำมันกัญชา
- 5) การมีทัศนคติการใช้น้ำมันกัญชาที่ดี
- 6) การมีคุณภาพชีวิตในระดับดี

### ปัจจัยเสริม

- 1) การมีทัศนคติของสมาชิกในครอบครัว
- 2) การสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนรู้จัก
- 3) การสนับสนุนจากบุคลากรทางสุขภาพ
- 4) การได้รับข้อมูลจากสื่อสังคม

### ปัจจัยเอื้อ

- 1) การเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่าย
- 2) การเข้าถึงน้ำมันกัญชาที่ง่าย

## ข้อเสนอแนะ

ควรสนับสนุนการสร้างเสริมความรู้ทางสุขภาพในการใช้น้ำมันกัญชาให้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีการใช้น้ำมันกัญชาอย่างถูกต้อง